



藥物成分

劑型

櫃號

Risperidone

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-377

## ☞ 藥品商品名及含量

利生妥膜衣錠 2 毫克/錠 (Risdal)

理思必妥膜衣錠 2 毫克/錠 (Risperdal)

## ☞ 藥品作用

本品用來治療思覺失調症、雙極性疾患之躁症發作、失智症病人具嚴重攻擊性、躁動或精神病症狀、行為障礙和其他破壞性行為障礙、兒童及青少年自閉症之躁動症狀。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

## ☞ 服用方式

1. 一般起始劑量為每日服用 1-2 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重腎或肝功能不全、易發生低血壓者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是作用於中樞系統之藥物、多巴胺作用劑、精神興奮劑、抗高血壓藥物、利尿劑、延長 QT 間隔之藥物。
3. 本藥可能會讓人警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 常見副作用為類帕金森氏症症狀、失眠、靜坐不能、焦慮、困倦、頭昏眼花，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立即就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹、血管性水腫)、延長 QT 間隔(心悸、暈厥、抽搐)。
6. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或

臺北市立



已懷孕請告知您的醫師。

7. 本藥會分泌於乳汁中，服藥期間不建議哺乳。