



藥物成分

劑型

櫃號

Nilotinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-316

☞ 藥品商品名及含量

泰息安膠囊 150 毫克、200 毫克 (Tasigna)

☞ 藥品作用

治療慢性骨髓性白血病。

☞ 服用方式

1. 建議成人每日 2 次，每次 2 粒，孩童請依照醫師指示服用。
2. 須空腹使用且服藥前兩個小時和服藥後一個小時不得進食，中間需間隔 12 小時。建議整顆服用，若遇到無法吞嚥病人可將膠囊內容物混在一茶匙蘋果泥中服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請忽略該劑，直接於下一次排定的時間服用下一劑，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是低血鉀症、低血鎂症或心律不整病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌 ketoconazole、抗生素 rifampicin、質子幫浦抑制劑、抗心律不整藥物、排出轉運體 P-glycoprotein。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 常見副作用為便秘、腹瀉、胃部不適、食慾下降、頭痛、肌肉疼痛、瘙癢或疲倦等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心跳加快或異常、任何昏倒、排尿困難、尿色加深、皮膚變色。
6. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 建議接受本藥治療期間及最後一劑藥物後 14 天暫停哺餵母乳。