



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Dorzolamide/ Timolol</b>	<b>眼用藥</b>	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-169		

## ☞ 藥品商品名及含量

可多舒明點眼液 2%/0.5%；5 毫升/瓶 (Co-Dorzomide Ophthalmic solution)

康舒目點眼液劑 2%/0.5%；5 毫升/瓶 (Cosopt Ophthalmic solution)

## ☞ 藥品作用

本藥可降低高眼內壓，用於治療高眼壓症、開放性青光眼、假性剝離性青光眼所造成之眼內壓升高。

## ☞ 使用方式

通常每天 2 次，每次 1 滴。劑量及間隔請依醫師指示，不可自行調整劑量或使用次數。

### 眼藥水使用步驟

		
1. 頭後仰或平躺，拉開下眼瞼	2. 眼睛朝上看，藥水瓶口朝眼瞼附近的眼白處點一滴眼藥水	3. 輕閉雙眼 2-5 分鐘並按壓眼內角鼻淚管處

## ☞ 注意事項

- 若要點 2、3 種眼藥水，每種間隔 10 分鐘；同時點眼藥水及眼藥膏時，應先點眼藥水，並最少 10 分鐘後再點眼藥膏。
- 平時請放置在陰涼避光處 (25°C 以下) 保存，眼藥開封後 1

個月未使用完畢即應丟棄。若顏色有變化、顆粒、混濁沉澱物，或出現異味，不可再使用。

3. 本藥含benzalkonium chloride防腐劑，可能造成眼部刺激，點藥前應先摘除隱形眼鏡並至少等待15分鐘才可重新配戴。benzalkonium chloride已知會造成軟性隱形眼鏡變色。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是磺胺類過敏、尿路或腎結石、肝腎功能障礙、慢性角膜缺損及/或有眼內手術病史、支氣管氣喘、慢性阻塞性肺病、心血管疾病、心搏徐緩、心臟衰竭等。
5. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服碳酸酐酶(carbonic anhydrase)抑制劑。
6. 常見副作用為頭痛、味覺障礙、眼睛刺激(灼熱與刺痛)、角膜炎、多淚、結膜炎、眼瞼發炎、眼睛癢、眼瞼刺激、視力模糊，若無法忍受請回診告知醫師。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：局部反應徵兆或症狀(眼瞼反應)與全身性過敏反應，包括血管性水腫、蕁麻疹及搔癢、皮疹、呼吸急促、罕見支氣管痙攣。
8. 懷孕期間不可使用，因資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師或藥師。