



藥物成分

劑型

櫃號

Morphine

口服液

版本：TPE202309／檔號：2023-804

☞ 藥品商品名及含量

硫酸嗎啡口服液 2 毫克/毫升; 60 毫升/瓶 (Morphine Oral sol'n)

☞ 藥品作用

用於緩解嚴重及頑固性疼痛。

☞ 服用方式

1. 通常為每日 3~4 次，每次 5~10 毫升；可能會因病情另有醫囑。
2. 請使用口服針筒或小量杯精確測量劑量。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嗎啡類藥物過敏、肝/心肺/腎/神經/腸胃道功能障礙、氣喘、頭部損傷、酒精中毒、癲癇、膽管阻塞、排尿及攝護腺問題。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是使用其他止痛藥、骨骼肌鬆弛劑、抗憂鬱劑、單胺氧化酵素抑制劑、止咳、感冒或抗過敏藥物、鎮靜安眠藥。
3. 呼吸抑制、低血壓及明顯的鎮靜作用或昏迷都可能發生。
4. 如果連續服用一段期間之後要停藥請遵照醫師指示慢慢減量，突然停藥可能引發戒斷症狀(疼痛反彈性增加)。
5. **請勿飲用酒類**，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
6. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
7. **若有剩餘藥品請攜至藥局回收，不可沖入馬桶或洗手台。**
8. 常見副作用為皮膚搔癢、便秘、噁心、暈眩、頭痛、嗜睡、

排尿困難，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

9. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心跳異常、非常虛弱/異常嗜睡、嚴重呼吸困難(呼吸變慢/淺)、皮疹搔癢合併臉部或喉部腫大、意識混亂或行為改變、癲癇/抽搐。
10. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。