



藥物成分

劑型

櫃號

Lidocaine

外用噴霧

版本：TPE202309／檔號：2023-274

☞ 藥品商品名及含量

益麻噴霧劑 10% 50 毫升/瓶(Quicaine Spray)

苦息樂卡因唧筒式噴霧劑 10% 50 毫升/瓶 (Xylocaine Spray (Pump Spray))

☞ 藥品作用

局部麻醉。

☞ 使用方式

1. 每次壓下定量活塞，可釋出 10 毫克 lidocaine，醫師會依據不同手術的類別及部位指示需要噴霧的次數。
2. 使用前不需先將要噴霧之部位擦乾。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能不佳、對醃胺類局部麻醉或噴霧溶液有過敏病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗心律不整藥物。
3. 常見副作用為塗佈部位局部刺激性、喉嚨痛、聲音嘶啞，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：失聲、舌頭或頰黏膜之麻木導致吞嚥困難。
5. 使用時應避免接觸眼睛、傷口黏膜處。
6. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
7. 目前對胎兒的風險不明，因為臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。