



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Brodalumab</b>	<b>針劑</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-068		

## ☞ 藥品商品名及含量

**立美西膚皮下注射劑 210 毫克/1.5 毫升 (LUMICEF Subcutaneous Injection)**

## ☞ 藥品作用

LUMICEF 是一種人類介白素-17 受體 A (IL-17RA) 拮抗劑，用於治療：

1. 適合接受全身性治療的中至重度斑塊性乾癬成人病人。
2. 適合接受全身性治療的膿疱性乾癬之成人病人。
3. 對疾病緩解型抗風濕性藥物(DMARDs)無效或無法耐受的活動性乾癬性關節炎成人病人。
4. 治療患有活動性僵直性脊椎炎的成人病人。

## ☞ 使用方式

1. LUMICEF 之建議劑量為第 0、1 和 2 週皮下注射 210 毫克，之後每 2 週給予 210 毫克。
2. 若治療 12 週至 16 週後，未能達到適當的治療反應時，應考慮停止治療。在未達到適當反應的病人，繼續使用超過 16 週不太可能有更大的成效。
3. 注射部位：大腿。腹部(勿注射於肚臍周圍 2 吋內)。上臂外側區域(需由他人注射)。

## ☞ 注意事項

1. 在開始使用 LUMICEF 之前，應先進行評估病人是否有結核病感染。
2. LUMICEF 以皮下注射給藥。每支預充填注射針筒為單次劑量。
3. 務必要在醫療照護人員的指導和監督下使用 LUMICEF。當醫療照護人員認為病人適當且病人已接受使用預充填注射針筒之皮下注射技術的適當訓練後，病人可自我注射 LUMICEF。

4. 告知採取自我給藥之病人給藥前務必要先研讀「使用說明書」並且必須注射所有的劑量[請參照「使用說明書」]。
5. 請勿將 LUMICEF 注射在皮膚敏感、受傷、發紅、硬化、肥厚、落屑或被乾癬影響的部位。忘記用藥，可在想起時儘快使用；但若接近下次用藥時間，則按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。
6. 如果出現自殺念頭、新的或惡化的憂鬱症、焦慮或其他情緒變化等情況，應立即就醫。可致電「全國自殺預防生命線」的專線電話：1995。
7. LUMICEF 可能會降低其免疫系統對抗感染的能力。需與醫療照護人員溝通任何感染病史的重要性，而且如果產生任何感染的徵候或症狀時，要告知醫療照護人員。
8. 如果產生有克隆氏症的徵候和症狀時，要就醫。
9. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
10. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師 / 藥師。

## ☞ 藥品儲存

於 2°C 至 8°C 下冷藏，並保存於原包裝盒內。必要時，保存於避免光線和熱源的原包裝盒內，在最高 25°C 的室溫下，最長只可貯存 14 天。一旦預充填注射針筒回復到室溫後，請勿再放回至冰箱。在室溫下放置長達 14 天後即應丟棄。勿冷凍、勿搖晃。