



藥物成分	劑型	櫃號
Glycine/ Glycyrrhizin/ DL-Methionine	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-461		

☞ 藥品商品名及含量

妙化肝膜衣錠 Glycine 25 毫克 + Glycyrrhizin 25 毫克 + DL-Methionine 25 毫克 (Miyaphargen)

☞ 藥品作用

1. 有解毒和輔助脂肪分解作用，保護肝臟，改善肝臟機能。
2. 有抗發炎和抗過敏作用，改善皮膚疾患。
3. 治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍。

☞ 服用方式

1. 通常成人每日 3 次，每次 2~3 粒，小孩是成人半量，於飯後服用。
2. 若不慎忘記服藥，12 小時內請立即補服，但若已接近下一次服藥時間(超過 12 小時)，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是康氏症(原發性醛固酮症)、肌肉病變、低血鉀症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 furosemide、ethacrynic acid、thiazide 系列利尿劑，與本藥併用可能造成低血鉀症。
3. 常見副作用為低血鉀、血壓上升、鈉離子和體液滯留浮腫、體重增加等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 低血鉀症可能造成肌肉病變，如果有下列症狀，請立刻

停藥就醫：脫力感、四肢痙攣、麻痺等。

5. 懷孕等級 D，在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。