



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Sitagliptin / Metformin</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-748		

## ☞ 藥品商品名及含量

捷糖穩膜衣錠 50/500 (Janumet®)

## ☞ 藥品作用

含 2 種不同作用的口服降血糖成份，改善第二型糖尿病病人的血糖控制，治療第二型糖尿病。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒與食物併服。
2. 與食物併服可降低腸胃道不適，如腹瀉、噁心、嘔吐等。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 Sitagliptin、Metformin 或其他藥物過敏及您正在使用的藥物(包括非處方藥)，尤其是胰島素分泌刺激劑(例如 sulfonylurea、meglitinide)、thiazides 與其它利尿劑、皮質類固醇、phenothiazines、甲狀腺製劑、雌激素、口服避孕藥、phenytoin、菸鹼酸、擬交感神經作、擬交感神經作用劑、鈣離子通道阻斷劑、以及 isoniazid。
2. 請告訴醫師，您目前或曾有過的疾病，如：第一型糖尿病、腎功能障礙或糖尿病酮酸血症。
3. 常見副作用為腹瀉、噁心、嘔吐、乏力、頭痛、胃腸道不適等。
4. 發現下列症狀，請立即回診：低血糖、乳酸中毒、胰臟炎。
5. 服藥期間請勿劇烈或長期飲酒。
6. 手術前應告知醫師服用此藥。

臺北市立

7. 如要接受含碘化物顯影劑的放射性診斷檢查，本藥須在檢查前後 48 小時停止使用。

8. 女性計畫懷孕或已懷孕就診時請務必告知醫師。