



藥物成分	劑型	櫃號
Hyoscine Butylbromide	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-236		

☞ 藥品商品名及含量

補斯可伴糖衣錠 10 毫克/錠 (Buscopan)

☞ 藥品作用

胃腸痙攣及運動亢進、膽管痙攣、尿路痙攣、女性生殖器之痙攣症狀。

☞ 服用方式

1. 一日 3-5 次，每次 1-2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。盡可能保持每日於相同時間服藥，若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是窄角性青光眼、腸道阻塞或尿道出口阻塞以及心跳過速心律不整。
2. 重症肌無力、巨結腸症以及對 hyoscine-N-butylbromide 或產品中任一成分曾發生過敏反應之病患禁用本藥。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是三環抗憂鬱藥、抗組織胺、或其他抗膽鹼藥物。
4. 此藥與促蠕動藥物如 Metoclopramide 併服時，兩種藥物對腸胃道的作用均會減弱。
5. 常見副作用包括口乾、異常出汗、心跳過快、暈眩、意識混亂以及尿滯留，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。