



藥物成分	劑型	櫃號
Benzbromarone	口服藥	

版本：TPE202309 / 檔號：2023-533

☞ 藥品商品名及含量

勉治錠 50 毫克 (Beenrone)

優力康錠 50 毫克 (Euricon)

☞ 藥品作用

治療痛風、高尿酸血症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1~2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 使用本藥前須檢查肝功能，以確認有無肝功能異常，並應告知使用本藥可能有肝臟疾病的副作用。
2. 猛爆性肝炎等嚴重肝臟不良反應主要會在開始投藥前六個月內發生，因此最少在最初給藥六個月內，應定期進行肝功能檢查。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是尿酸性腎臟結石或肝、腎功能不良之病史。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Coumarin 系抗凝血劑。
5. 急性痛風發作時，不可開始使用本劑。
6. 使用本藥期間建議多喝水，避免尿酸沉積。
7. 副作用偶有皮膚過敏(蕁麻疹、搔癢等)、胃痛、噁心、腹瀉、肝功能值上升等，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. 在使用期間如果有肝臟不良反應之症狀如：食慾不振、噁心嘔吐、疲倦虛弱、腹痛、下痢、發燒、深色尿液、結膜

臺北市立

變黃等症狀，應停藥並立即就醫。

9. 動物實驗中曾有催畸形作用報告，懷孕或有懷孕可能性婦女不可投與此藥，請事先告知或諮詢您的醫師。