



| 藥物成分 | 劑型 | 櫃號 |
|----------------------------|-------|----|
| Ciclesonide | 噴霧吸入劑 | |
| 版本：TPE202309 / 檔號：2023-550 | | |

☞ 藥品商品名及含量

保衛康治喘樂吸入劑 160 微公克/每定量 60 定量/每瓶 (Alvesco 160 Inhaler)






☞ 藥品作用

成人、青少年及 4 歲以上兒童之持續性氣喘
 本品只可用於氣喘的預防，減少急性氣喘發作，並不能用於減緩急性氣喘症狀。

☞ 使用方式

如果要使用新的吸入劑或吸入劑已一個星期以上未使用的話，一開始須先對著空氣噴三次後才可使用。
 之後每次劑量皆按照下列步驟使用：

| | |
|---|--------------------------------|
|  | 步驟一、將吸入器噴嘴之護蓋取下。 |
|  | 步驟二、檢查吸入器是否清潔與乾淨。 |
|  | 步驟三、將食指放在吸入器頂部，拇指放在底部保持瓶底向上位置。 |



步驟四、用輕鬆舒適方式盡可能地吐氣。



步驟五、將吸入器噴嘴放入口內，並以雙唇緊密包住噴嘴。



步驟六、先開始用嘴巴吸氣，同時按壓一次吸入器，持續緩慢且深深地用嘴巴吸氣。



步驟七、從嘴巴移開吸入器，並屏住呼吸約 10 秒時間。



步驟八、最後慢慢地呼氣，如果要一劑以上之用藥，請間隔 30 秒再重複步驟三至七。

此劑型為液狀噴霧劑，使用前無須搖晃；使用完後請漱口，減少鵝口瘡發生的機率。

☞ 注意事項

1. 對於 Alvesco 所含任一成分過敏者禁忌使用。
2. 通常每日 1~2 次，每次 1~2 下，當 Alvesco 為一天投與 1 次時，比較建議在晚上投與，但早上投與也是有效的，請

依照醫師的指示，固定於早上或晚上投與。

3. 常見不良反應包括逆理性氣管痙攣(發生率 10%)，重症患者可能需考慮停用 Alvesco，其它較不常見之不良反應包括口腔黴菌感染、噁心、嘔吐、味道不佳、喉嚨乾、咳嗽、頭痛等，請於回診時由醫師檢查醫治。
4. 目前沒有懷孕或哺乳方面的安全性資料，故除非醫師評估使用的益處大過於風險才可使用。
5. 容器內含增壓液體，請於室溫下儲存。

☞ 清潔方式

1. 建議每周清潔一次。
2. 請用乾的面紙或布清理乾淨，吸入器本體不能用水清洗或放於水中。

☞ 如何觀測剩餘藥量

本藥無劑量視窗，請民眾於藥品開封時，於瓶身寫上開封日期以便計算剩餘藥量。請時常計算檢查剩餘藥量。