

藥物成分

劑型

櫃號

Nystatin

陰道栓劑

版本：TPE202309／檔號：2023-320

☞ 藥品商品名及含量

寧司泰定陰道錠 100000U/錠 (Nystatin)

速淨陰道錠 100000U/錠 (Statin)

☞ 藥品作用

治療念珠菌所引起之陰道感染症。

本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

☞ 使用方式

1. 陰道用，通常一日 1~2 次，每次 1 錠，療程約兩週。

2. 使用方式：

(1) 用藥前後應洗淨雙手，打開外包裝之鋁箔。

(2) 平躺於床上後，以屈膝雙腿微張開的方式，用中指或食指將錠劑送入陰道最少 2 個指節深度。

(3) 藥品塞入後請暫勿起床走動，白天可使用護墊以免分泌物弄髒底褲。

3. 本品不可口服，請勿經口投與藥物。

4. 若不易塞入，可用溫水濕潤後再次塞入。

5. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加次數，治療期間如果症狀減輕或消失，亦不可自行停藥。若不慎忘記請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。

2. 藥物使用期間應避免性行為。

3. 生理期間使用，應勤加更換衛生棉以保持清潔。

4. 使用後如有黏稠或水液狀之液體自陰道流出，屬正常現象，勿立即進行陰道之沖洗，以免將未吸收的藥物洗掉，而影響藥效。

5. 常見副作用為陰道有灼熱感或刺激性，但一般都不嚴重，

若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重過敏(蕁麻疹、臉部四肢腫脹、舌頭或咽喉腫脹、胸悶、呼吸困難)
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。