



藥物成分

劑型

櫃號

Semaglutide

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-389

## ☞ 藥品商品名及含量

瑞倍適錠 3 毫克/錠、7 毫克/錠、14 毫克/錠 (Rybelsus Tablets)

## ☞ 藥品作用

血糖仍控制不良的第二型糖尿病。

## ☞ 服用方式

1. 通常一日 1 次，**空腹服用**。起始劑量為每日 3 毫克，請依醫師指示調整劑量。
2. 本藥應搭配少量(120ml，約一紙杯)的水整顆吞服，錠劑不應剝開、壓碎或咀嚼。服藥後應等待至少 30 分鐘再進食、喝水或服用其他口服藥物。
3. 若忘記服藥如果漏掉一劑，則應跳過，第二天再服用下一劑，**不可服用雙倍劑量**。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是胰臟炎病史、本身或家族有甲狀腺髓質癌病史，或患有第二型多發性內分泌腫瘤症候群。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是四碘甲狀腺素、warfarin、rosuvastatin。
3. 常見副作用為胃腸道問題，包括噁心、腹瀉及嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重胃腸道作用及脫水、急性胰臟炎、急性腎損傷、低血糖。
5. 本藥可能會併用其他促胰島素分泌劑 (如 sulfonylureas) 或是胰島素，可能增加低血糖風險。若疑似發生低血糖症狀請先依低血糖方式處理，並告知您的醫師/藥師。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，建議育齡女性需採用避孕措施，女性計畫懷孕或

臺北市立



已懷孕請告知您的醫師。

7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。