



藥物成分	劑型	櫃號
Activated Charcoal	口服粉劑	
版本：TPE202309／檔號：2023-009		

☞ 藥品商品名及含量

蓋抹滅顆粒劑 813 毫克/克 61.5 克/瓶 (Carbomix Granules for Suspension)

☞ 藥品作用

活性碳成分，用於緊急治療藥物或化學品中毒，能在胃腸內吸附某些藥物以減緩其吸收，而達成解毒的療效。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

☞ 服用方式

1. 配製方式：於本藥瓶中加入約 400 毫升蒸餾水，到標籤上之紅色線後，徹底搖勻混合成懸浮液。
2. 一般急性中毒時，儘快口服或從胃管灌入 1-2 瓶配製好的活性碳懸浮液。嚴重中毒時，在服用初劑量後，每 4 至 6 小時應再服用 160 毫升配製好懸浮液，連續數天，請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是避孕藥、鐵鹽、鋰鹽、酒精。
3. 本藥對腐蝕性物質引起的中毒無效，如確定為腐蝕性物質引起的中毒應避免使用。
4. 常見副作用為便秘、腹瀉，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 女性哺乳、計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。