



藥物成分

劑型

櫃號

Cephalexin

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-105

☞ 藥品商品名及含量

"優良"優力黴素口服懸液用顆粒 25 毫克/毫升 (Ulexin Suspension)

☞ 藥品作用

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

☞ 服用方式

1. 成人：每日劑量是 1 至 4 Gm，分次服用。普通感染，成人劑量每六小時服用 250 mg，對較嚴重的感染，則需較高劑量。
2. 兒童：每日劑量為每公斤體重 25 ~50 mg，分四次服用，嚴重感染時劑量可加倍。

	一般感染	嚴重感染
成人及兒童體重超過 25 公斤者	每六小時 250 mg	每六小時 500 mg 至 1 Gm
兒童體重在 25 公斤以下者	照體重每公斤每日 25~50mg，分四次服用	照體重每公斤每日 50~100mg，分四次服用

3. 本劑服用時，須加純水至 60ml，搖勻後使用，溶解後請儲存於冰箱中，並於一星期內服用完畢。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是青黴素類藥品、頭芽孢菌素類藥品過敏史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Warfarin 類抗凝血劑。
3. 請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。
4. 常見副作用為腹瀉、噁心、嘔吐、消化不良及腹痛但一般都不嚴重若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

5. 如果有下列症狀請立刻就醫：史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。
6. 懷孕等級 A 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。