

藥物成分

劑型

櫃號

Estradiol

外用藥膏

版本：TPE202309／檔號：2023-192

## ☞ 藥品商品名及含量

愛斯妥凝膠 0.6 毫克/克，80 克/瓶 (Oestrogel Gel)

## ☞ 藥品作用

可治療因疾病、手術或自然停經引起之停經症候群或其他荷爾蒙缺發引起的症狀，是種荷爾蒙替代療法。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。


## ☞ 使用方式

1. 愛斯妥凝膠是種由皮膚吸收的藥品，須每天同一時間使用，建議於夜間洗完澡後，塗抹在身體乾淨無毛髮的大面積皮膚上(例如腹部、大腿內側)，**須注意不可塗抹在乳房、陰道或毛髮處。**
2. 每次塗抹的量請依醫師指示，一般建議每日使用 2.5 克凝膠；本品附有計量閥，一次擠壓劑量為 1.25 克凝膠；通常使用三周後會停藥一周作每月循環使用。



## ☞ 注意事項

1. 使用前後請洗手，並避免幼兒及寵物接觸到此藥物。
2. 請告訴醫師或藥師是否有藥物過敏或其他疾病，特別是乳癌(或家族史)、子宮內膜癌或其他惡性腫瘤、血液栓塞疾病(如深層靜脈栓塞)、紅斑性狼瘡、高血脂症或胰臟炎。
3. 使用期間如有發現不正常的陰道出血(超過正常時間或持續點狀出血)、乳房脹痛或有硬塊、噁心、頭痛或視力模糊時，應立即回診請醫師評估。

- 
4. 保存請放陰涼處，勿冷藏或冷凍。
  5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
  6. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。