



藥物成分

劑型

櫃號

Bromazepam

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-537

- ☞ 藥品商品名及含量 (藥物學理分類：Benzodiazepines, BZD)
立舒定錠 3 毫克/錠 (Lexotan)
"威勝" 樂坦錠 3 毫克/錠 (Lotan)
- ☞ 藥品作用
本藥品可用來減緩焦慮，亦可作為安眠或肌肉痙攣之治療。
- ☞ 服用方式
 1. 請遵照處方使用，勿自行增加藥量、服藥次數或服藥日數。
 2. 如果連續服用一段期間之後請遵照醫師指示慢慢減量，突然停藥可能引發戒斷症狀(焦慮、睡不著、易怒)，如有問題請洽詢藥師或醫師。
 3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
- ☞ 注意事項
 1. 請告訴醫師或藥師您是否對 BZD 類安眠藥物過敏或是有其他疾病，特別是重症肌無力、嚴重呼吸功能不全、睡眠呼吸暫停症候群、肝功能不良病史。
 2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是巴比妥類藥物、鴉片類藥物、抗癲癇類藥品、BZD 拮抗劑 flumazenil。
 3. **本藥可能會讓人覺得嗜睡、警覺性及協調能力降低，在還沒確定此類藥物對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。**
 4. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
 5. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
 6. 常見副作用為虛弱、頭暈、嗜睡、不穩、疲倦，但一般都

不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：話多、不安、焦慮、亢奮、發抖、肌肉痙攣、意識不清、癲癇、皮膚或眼球變黃。

8. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。