



藥物成分

劑型

櫃號

Dimethicone

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-157

☞ 藥品商品名及含量

加斯克兒錠 40 毫克/錠 (Kascoal tablet)

瓦斯敏錠 40 毫克/錠 (Gasmin tablet)

☞ 藥品作用

解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

☞ 服用方式

1. 成人每日 4 次，於飯後每次 2 粒或視醫師處方服用。每日不建議超過 500 毫克。
2. 2 到 12 歲的兒童建議每日 4 次，每次 1 粒，每日不建議超過 240 毫克。
3. 若小於 2 歲，每日 4 次，每次半粒，每日不建議超過 240 毫克。

☞ 注意事項

1. 避免飲用碳酸飲料或其他易造成氣脹的食物。
2. 可能有輕微腹瀉、胃腸不適、腹痛、嘔氣、食慾不振等現象。為確保療效，若症狀輕微請勿停藥。
3. 本藥品不適用已知或懷疑有小腸穿孔或阻塞的病人。
4. 對成分過敏者請勿服用。
5. 孕婦和哺乳婦女請和醫師討論後再行使用。
6. 藥品含有乳糖，患有半乳糖不耐症之患者，Lapp 乳糖酶缺乏或葡萄糖 - 半乳糖吸收不全之罕見遺傳性問題的無乳糖飲食患者應避免使用。