

藥物成分

劑型

櫃號

Diclofenac Pot.
Diclofenac Sod.

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-569

☞ 藥品商品名及含量

克他服寧 25 毫克/錠 (Cataflam)

待可服寧 膜衣錠 25 毫克/錠 (Volna-K)

非炎鉀糖衣錠 25 毫克/錠 (Voren-K)

非炎腸溶微粒膠囊 50 毫克/膠囊 (Voren E.M.C)

☞ 藥品作用

用以緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒。

2. 膠囊應直接吞服，勿咬碎、磨粉。

3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏，特別是對阿斯匹靈 (aspirin)、消炎止痛藥過敏；或有疾病史，特別是消化性潰瘍、胃炎、腸胃出血、肝臟、心臟、腎臟或血液疾病。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是阿斯匹靈、抗凝血劑(如 warfarin)、ACE 抑制劑、利尿劑、鋰鹽、methotrexate、cyclosporine。

3. 如果您將要進行手術(包含牙科手術)，要記得告訴醫師或牙醫師您正在使用本藥。

4. 長期使用本藥需定期做臨床檢查(尿液檢查、血液檢查、肝腎功能檢查)。

5. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。

臺北市立

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：出血、血便、耳鳴、四肢水腫、皮膚紅疹、極罕見的嚴重皮膚不良反應(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。

7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。