

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

**Hydroxychloroquine  
Sulfate**

**口服藥**

版本：TPE202309／檔號：2023-621

### ☞ 藥品商品名及含量

瘡寧膜衣錠 200 毫克/錠 (Hydroquine)

必賴克慶錠 200 毫克/錠 (Plaquenil)

### ☞ 藥品作用

治療慢性風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、瘧疾。

### ☞ 服用方式

1. 通常一日 1-2 次，每次 1-2 粒，醫師會依個人情況調整。
2. 服用藥品時，應予食物或牛奶併服。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

### ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是視網膜病變、懷孕及哺乳者、蠶豆症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 digoxin、抗生素、胃藥、降血糖藥物、治療重症肌無力等藥品。
3. 服用本藥前和治療期間，建議接受眼科檢查。
4. 服用瘡寧膜衣錠與制酸劑之間，應至少間隔 4 小時。
5. 常見副作用為腹瀉、腹痛、噁心嘔吐、視力模糊、皮膚搔癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：視力異常、心肌病變。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，孕婦不建議使用。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。