

藥物成分

劑型

櫃號

**Fluvoxamine
maleate**

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-221

☞ 藥品商品名及含量

樂得腸溶錠 100 毫克/錠 (Lote E.C.)

無鬱寧膜衣錠 50 毫克/錠 (Luvox F.C.)

健復膜衣錠 50 毫克/錠 (Genbou F.C.)

☞ 藥品作用


治療重度憂鬱症、強迫症。

☞ 服用方式

1. 本藥通常晚上或睡前 1 次或每日 2 次使用。可與食物併服或空腹服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、腎功能不良，有精神疾病、憂鬱症、癲癇、心血管疾病、糖尿病、青光眼。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物，特別是肌肉鬆弛劑 tizanidine、鎮靜安眠藥 ramelteon、抗精神病藥 pimozide、單胺氧化酶抑制劑(MAOI)、lithium、tryptan、抗凝血劑(包含 warfarin 及 NSAID 類藥物)、抗憂鬱劑、抗癲癇藥等。
3. 應嚴密監視患者臨床病徵變化，若惡化、自殺意念或不尋常的行為改變，並隨時與醫師聯絡。
4. 此藥物可能導致暈眩，在您未清楚藥物可能對您造成影響前不要開車或使用危險機械。
5. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的嗜睡作用。

- 
6. 常見副作用為厭食、失眠、不安、噁心嘔吐、口乾、頭痛、不正常射精，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
 7. 若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：心跳加快、流汗、緊張、失眠、虛弱。
 8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示有可能發生不良反應，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
 9. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。