



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Lactitol Monohydrate</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-256		

## ☞ 藥品商品名及含量

舒必通粉劑 20 公克/包 (Speedon)

## ☞ 藥品作用

便秘、急慢性肝性腦病變。

## ☞ 服用方式

1. 成人通常起始每天 20 公克，隨後每天 10 公克，早上或晚上隨餐或飲料服用，服畢飲用 200-400 毫升液體飲料。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腸道阻塞、胃腸道疾病、不明原因腹痛或糞中帶血、水和電解質恆定障礙、腹瀉。
2. 常見副作用血壓升高、脹氣、鼓腸、飽滿感、腹痛、腹部痙攣、腹瀉、上呼吸道感染，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 現有證據尚不確定或不足以確定孕婦使用時的胎兒風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
4. 現有證據尚無結論確定母乳餵養期間使用的嬰兒風險，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。