



藥物成分
Rotigotine

劑型
貼片

櫃號

版本：TPE202309／檔號：2023-385

☞ 藥品商品名及含量


紐普洛穿皮貼片劑 6 毫克/24 小時 (Neupro Transdermal Patch)

☞ 藥品作用

原發性帕金森氏症症狀治療藥物。


☞ 使用方式

1. 每天貼一片，將黏貼面輪流貼在不同的部位(如下圖灰色部位)，且同一部位 14 天內不宜重複黏貼。



2. 使用方式：


- (1) 將貼片從包裝袋取出。
- (2) 撕掉其中一半保護膜，手指頭請勿碰觸到黏貼面。



- (3) 將露出黏著面的那半邊貼到乾淨皮膚上。
- (4) 然後撕掉乾淨的保護膜。



- (5) 以掌心緊貼貼片 20 至 30 秒，確認貼片有貼緊皮膚。
- (6) 黏貼完畢，應立刻以肥皂和清水洗手。



- (7) 移除貼片時，小心緩慢地撕除貼片。
- (8) 可以用溫水與肥皂將黏貼處搓洗移除殘留於皮膚上的黏性物質(黏膠)。也可使用少量的嬰兒油去除沒洗掉的黏膠。

- 請依照醫師指示使用，貼片不可進行任何切割、剪裁或破壞，也不可自行調整劑量或停用。
- 如忘了在每天原本固定的時間更換貼片，或是貼片失去黏性而掉落，應在一天中剩下的時間換用一張新的貼片，亦需貼在不同的部位，並在隔天平常固定的時間更換新的貼片，請勿使用兩倍的劑量來補足先前忘記的藥量。

⌘ 注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能障礙。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗精神病藥物、胃藥 metoclopramide、安眠藥、降血壓藥。
- 本藥可能會讓人嗜睡或突然睡著，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。

4. 黏貼本藥期間可正常淋浴或游泳，但請勿沖刷搓洗貼片。須避免粘貼貼片的區域曝露外部熱源(過度日曬、加熱墊、三溫暖或熱水浴之類的其他熱源)。
5. 進行核磁共振造影或心臟電擊之前，請告知醫師並移除本藥，執行完後，再重新貼上新的貼片。
6. 常見副作用為剛開始使用時有噁心與嘔吐症狀、貼片黏貼處輕中度發紅/癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：情緒、行為異常、移除貼片處持續數天發紅/癢。
8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有不良反應的紀錄，懷孕期間不建議使用本藥，育齡婦女應使用適當的避孕方法。女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥會抑制母乳分泌，服藥期間不建議哺乳。