

藥物成分

劑型

櫃號

Doxepin

外用藥膏

版本：TPE202309／檔號：2023-171

☞ 藥品商品名及含量

普膚乳膏 50 毫克/克 (Ichderm Cream)

逗喜乳膏 50 毫克/克 (Antidoxe Cream)

☞ 藥品作用

可作為短期治療成人因濕疹性皮膚炎(如異位性皮膚炎或單純性慢性苔癬)所導致的中度搔癢症。

☞ 使用方式

1. 每日應薄層塗敷 4 次，每次使用應間隔 3-4 小時。
2. 使用天數不應超過 8 天。

☞ 注意事項

1. 目前並無資料確認使用超過 8 天以上的安全性及療效，長期使用超過 8 天可能導致較高的血中濃度。
2. 本藥膏塗敷面積大於體表之 10% 易有顯著的嗜睡副作用，如有顯著嗜睡情形應減少治療之體表面積，減少每日給藥次數，減少乳膏使用量，或停止用藥並回診請醫師評估。
3. 本藥膏禁止用於因窄角性青光眼而接受治療或尿滯留傾向的患者，以及對此成分過敏者。
4. 保存請放陰涼處，勿冷藏或冷凍。
5. 使用本藥品目前對胎兒風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有顯示致畸胎的紀錄，女性若有生育計劃或已懷孕請告知醫師；本藥品可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。