



藥物成分	劑型	櫃號
Raloxifene	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-724		

☞ 藥品商品名及含量

鈣穩膜衣錠 60 毫克/錠 (Evista F.C.)

樂骨康膜衣錠 60 毫克/錠 (Ralo F.C.)

☞ 藥品作用


Raloxifene 是一種具有選擇性的雌激素接受體調節劑 (SERM)，可降低骨骼吸收作用。當骨骼吸收作用降低，可增加骨密度及降低骨折發生率。

☞ 服用方式

1. 建議劑量為每日 1 次，每次 1 粒。
2. 任何時間點均可服藥，且不受食物影響。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是乳房腫塊或乳癌、癌症或腫瘤、鬱血性心衰竭、靜脈血栓疾病(包括深部靜脈血栓、肺栓塞及視網膜靜脈血栓)、高血脂、肝臟等疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是全身性雌激素、Cholestyramine 或是其他陰離子交換樹脂、抗凝血劑 Warfarin、抗生素 Ampicillin。
3. 服用本藥時為避免發生血栓性栓塞的副作用，應避免長時間臥床，若需進行任何手術前請先告知醫師正在服用本藥，並詢問是否需停藥。
4. 常見副作用為熱潮紅和腿抽筋，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：視覺、說話、協調異常或



喪失，呼吸短促，咳血，胸部、四肢痛或麻木。

6. 懷孕等級 X，服用本藥應同時採取有效的避孕措施，若疑有懷孕應立即與醫師聯絡。此外服用本藥時也不建議哺餵母乳，必要時請與醫師/藥師討論。