



藥物成分	劑型	櫃號
Sertaconazole nitrate	乳膏/ 凝膠	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-391		

☞ 藥品商品名及含量

達來乳膏 (Zalain Cream 2%) 20mg/g 15g Cream

達來外用凝膠 2% (Zalain External Gel 2%) 20mg/gm 30gm gel

☞ 藥品作用

1. 乳膏：治療皮膚表面黴菌感染，例如足癬、股癬、圓癬、鬚癬、手癬、念珠菌、變色糠疹。
2. 外用凝膠：治療頭皮之脂漏性皮膚炎，及因黴菌感染所引起之頭皮屑。

☞ 使用方式

1. 乳膏：每天使用乳膏 1-2 次，均勻塗抹本藥物於含患部外 1 公分處。
2. 外用凝膠：一週使用 2 次，適量塗抹於頭皮或頭髮上，經 3-5 分鐘以清水沖洗，連續使用數週。

☞ 注意事項

1. 少數病例在剛開始使用本品的前幾天，可能會有輕微且短暫的紅斑反應，但無需馬上停藥，如症狀持續或造成不適，請立即告知您的醫師及藥師。
2. 使用本藥需避開眼、口腔或陰道黏膜等部位。
3. 藥品應置於 25°C 以下陰涼乾燥處，避免陽光直射及兒童不易取得之處。
4. 若對本藥過敏，請告知您的醫師及藥師。
5. 若您已懷孕或正在授乳，請告知您的醫師。
6. 除藥品另有標示使用期限外，一般效期為開方期限後三個月。