



藥物成分	劑型	櫃號
Dinoprostone	陰道栓劑	

版本：TPE202309／檔號：2023-158

☞ 藥品商品名及含量

普洛舒定—益二型陰道錠 3 毫克/錠 (Prostin E2 V.T.)

☞ 藥品作用

對經產婦或順產婦之引產有效。

☞ 使用方式

塞入一錠（3 毫克）至後穹窿，使用後六至八小時如仍無法進行生產，可使用第二顆。在二十四小時之內，最高總投予劑量為 6 毫克，不建議連續使用超過兩天。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病特別是心血管功能異常、肝、腎功能損害、氣喘、青光眼或眼內壓升高或羊膜及絨毛膜破裂時。
2. 常見副作用為副作用為：腹瀉、噁心、嘔吐，但一般都不嚴重若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 因為前列腺素可能會加強催產素的作用，所以不建議同時併用其他的催產製劑。若要併用催產素，一般建議在使用普若舒定-益二型子宮頸凝膠，陰道內凝膠，或陰道錠後至少間隔六小時再使用催產素。
4. 使用普若舒定-益二型陰道錠期間，需要密切監控子宮活動及胎兒心跳速率。當病人子宮張力過高、過度收縮，或是胎兒心跳速率異常等情形發生時，為了產婦及胎兒的安全必須馬上給予完善的處理。
5. 前列腺素 E2 具有過度刺激肌肉的特性，藥物過量可能呈現子宮過度收縮/及張力過高情況。發生上列情形應改變產婦姿勢/及給予母體氧氣補給。
6. 給予前列腺素 E2 促使子宮頸成熟，其後續造成的過度刺激反應，可以使用乙型交感神經刺激劑(β -adrenergic)藥物來改善。