



藥物成分

劑型

櫃號

Fluconazole

口服液

版本：TPE202309 / 檔號：2023-212

☞ 藥品商品名及含量

復抑諾懸液用粉 40 毫克/毫升 (Fluzole Powder for Oral Suspension)

☞ 藥品作用

治療念珠菌局部或全身感染、囊球菌感染、預防後天免疫缺乏症候群病人的黴菌感染。

☞ 服用方式

1. 使用前請先將粉劑配置成口服用懸浮液。

(1) 在加水前應先搖動裝有粉劑的藥瓶。

(2) 將 24 毫升的水加入藥瓶中，然後充分搖勻，使藥品跟水充分混合。配置後約 35 毫升之懸液劑，每毫升含 40 毫克之 fluconazole。

(3) 每次在取用懸液劑之前，務必再充分搖動藥瓶。

(4) 配置後之懸液劑應保存於 25°C 以下，無須冰存並避免陽光直射。

2. 依不同的黴菌感染有不同的使用劑量與頻次，需按照醫師的指示來使用。服用時可空腹或與食物一起併用。

3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對此藥或其他藥物過敏；是否有其他疾病，特別是肝臟、腎臟相關疾病。

2. 本藥會影響肝臟代謝的酵素，易有藥物交互作用，請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥 warfarin、sulfonyleureas 類降血糖藥、免疫抑制藥 tacrolimus、抗黴菌藥 voriconazole、macrolides 類抗生素、抗憂鬱藥

citalopram、抗心律不整 quinidine 等。

3. 泰復肯膠囊含有乳糖，有半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕見遺傳疾病的病人應避免使用。
4. 泰復肯膠囊服用後可能會產生頭暈的副作用，若駕駛或操作機械時須注意。
5. 常見副作用為噁心、嘔吐及頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心律失常；過敏反應(皮膚發疹、發癢)；肝功能異常(食慾降低、疲倦、胃腸不適、茶色尿、皮膚或眼白變黃)。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應/臨床資料不足/有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。在整個治療期間至最後一劑服藥後至少 1 週應採取有效避孕措施，避免懷孕。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。