



藥物成分	劑型	櫃號
Levocetirizine	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-268		

☞ 藥品商品名及含量

好克敏膜衣錠 5 毫克 (Neocetin)

驅異樂膜衣錠 5 毫克 (Xyzal)

☞ 藥品作用

治療過敏性鼻炎、慢性蕁麻疹等各種過敏症狀。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎功能障礙、半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良、癲癇。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 同時服用本藥及酒精類或中樞神經抑制劑，可能會加重警覺性降低。
4. 有尿液滯留誘發因子者(例如脊髓損傷、攝護腺肥大)必須謹慎使用。
5. 若欲執行皮膚過敏測試，應在測試前 3 天停用此藥。
6. 常見副作用為頭痛、鎮靜(嗜睡、疲勞)、口乾，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**【過敏反應(皮膚紅疹或是疑似血管性水腫)】**。
8. 懷孕等級 B，目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。