



藥物成分	劑型	櫃號
Testosterone	鼻內 凝膠劑	
版本：TPE202309 / 流水號：2023-416		

☞ 藥品商品名及含量

耐他妥鼻內凝膠劑 4.5% w/w (Natesto Nasal Gel)

☞ 藥品作用

臨床徵象及實驗室檢驗確認因睪固酮缺乏之男性生殖腺功能不足症(hypogonadism)的替代治療。

☞ 使用方式

1. 遵照醫師指示使用，每次間隔至少 6 小時，每次左右鼻孔各按壓 1 下(每按 1 下送出 5.5 mg 睪固酮)。
2. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，在下次用藥時間使用即可，不可使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否會對 Testosterone 過敏。
2. 若您有慢性鼻部病症或鼻部解剖結構變異，請主動告知醫師並與醫師諮詢。
3. 第一次使用本藥前，請先將開口朝下，按壓並放開幫浦 10 次後，有凝膠擠出後再使用。
4. 本藥僅可使用在鼻內，請勿塗抹身體任何其他地方。請與其他的鼻用製劑間隔至少 30 分鐘。
5. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥 warfarin、皮質類固醇、聖約翰草及相關草藥製劑、其他鼻用製劑。
6. 本藥可經由皮膚吸收，需特別小心不要讓哺乳/懷孕或可能懷孕之婦女及-兒童接觸到藥品或未覆蓋的塗抹部位，若不慎接觸應立即以肥皂及水清洗。
7. 請不要讓他人使用本藥，用完的空包請丟棄於幼兒/寵物無法取得之處。

臺北市立

8. 本藥最常見的不良事件為塗抹凝膠處的局部鼻部反應。最常觀察到的是流鼻水、流鼻血和鼻部不適，這些狀況在大多數案例中都是輕微的暫時性反應。

9. 本藥用於懷孕中和哺乳中的女性尤其具有風險。

Testosterone 可能對尚未出生的胎兒造成危害，使用本藥前請先和您的醫師諮詢。