



藥物成分	劑型	櫃號
Ledipasvir/ Sofosbuvir	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-752		

☞ 藥品商品名及含量

夏奉寧膜衣錠 90 毫克/ 400 毫克/錠 (Harvoni F.C.)

☞ 藥品作用

透過抑制C肝病毒的RNA複製來治療成人/12歲(含)以上兒童的慢性C型肝炎病毒感染。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次服用 1 粒，空腹或餐後服用皆可。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經因 sofosbuvir、ledipasvir 引起過敏或 B 型肝炎、人類免疫缺乏病毒感染及心臟病史、糖尿病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是肺結核藥物(如:rifampin)、amiodarone、digoxin、抗癲癇藥物、抗人類免疫缺乏病毒藥物、降膽固醇藥物(-statins)、聖約翰草等。
3. 若有服用含鎂、鋁的制酸劑，需間隔 4 小時。
4. 療程完整性：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，以達到完全控制病毒複製。
5. 常見副作用為疲倦、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：肝炎(噁心、嘔吐、食慾減少、黃疸等)、過敏反應(皮膚紅疹或是疑似血管性水腫)、心跳過慢、極度疲倦。

臺北市立

聯合醫院

7. 懷孕:目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。哺乳:本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。