



藥物成分	劑型	櫃號
Fluticasone/ Salmeterol	噴霧 吸入劑	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-602		

## ☞ 藥品商品名及含量

使肺泰 250 優氣吸入劑 250 微公克/25 微公克/劑量 (Seretide® 250 Evohaler)

吸洛復 250 定量噴霧吸入劑 250 微公克/25 微公克/劑量 (Seroflo® 250 Inhaler)

使肺泰 50 優氣吸入劑 50 微公克/25 微公克/劑量 (Seretide® 50 Evohaler)

## ☞ 藥品作用


治療氣喘(可逆性呼吸道阻塞疾病)及慢性阻塞性肺部疾病。

## ☞ 使用方式

1. 成人及十二歲以上之青少年：每日 2 次，每次吸 2 下 (Seretide® 250 Evohaler、Seroflo® 250 Inhaler)。
2. 四歲以上之兒童：每日 2 次，每次吸 2 下 (Seretide® 50 Evohaler)。

### 3. 測試吸入劑：

- (1) 吸入器在第一次使用前，輕輕擠壓吸口蓋的兩側，移除吸口蓋。
- (2) 充分振搖吸入器，將吸入器置於拇指與食指之間，拇指放在底部，亦即吸口的下方，並且對空氣試噴數下，直到計數視窗顯示“120”以確定它可以使用。
- (3) 在每次按壓噴出之前，都應振搖吸入器。如果吸入器一星期或更久以上未使用時，請移除吸口蓋，充分振搖吸入器，並對空氣試噴兩下確認藥是否有均勻噴出。吸入器每噴一次，剩餘劑量數值就會少 1。
- (4) 在某些情況下如吸入器掉落，可能會促使計數器計數。

 用藥指導短片

含輔助器



不含輔助器



#### 4. 使用吸入劑：

- (1) 移除吸口蓋，輕輕擠壓吸口蓋的兩側。
  - (2) 檢查吸入器內外，包含吸口是否有鬆動物。
  - (3) 充分振搖吸入器並確定移除所有鬆動物及確保吸入器內容物已混合均勻。
  - (4) 將吸入器直立置於拇指與食指之間，拇指放在底部，亦即吸口的下方。
  - (5) 盡量呼氣，然後將吸口置於齒間，緊閉雙唇，但不要咬它。
  - (6) 開始經口吸氣之後，立即用食指在吸入器的上方往下壓以釋出藥品，並同時仍保持穩定且深的吸氣動作。
  - (7) 摒住呼吸並將吸入器移開口部，且將食指移開吸入器的上方，繼續摒住呼吸，時間愈久愈好，直到感到不舒服為止。
  - (8) 如果需要吸入更多次，則將吸入器繼續保持直立，大約等 30 秒後再重複步驟 3 至步驟 7。
  - (9) 之後，以水漱口並吐出。
  - (10) 使用後應立即將吸口蓋放回正確位置。當正確放回時會與吸入器完全吻合。若未吻合，稍微轉動吸口蓋然後再試一次，但不要太用力。
5. 清潔方式：至少一個禮拜清潔一次，請勿將金屬罐放入水中。
- (1) 移開吸口蓋。
  - (2) 不要將金屬罐自塑膠外殼中取出。
  - (3) 以乾布、面紙，或棉布將吸嘴與塑膠外殼之內外擦拭乾淨。
  - (4) 將吸口蓋放回正確位置。當正確放回時會與吸入器完全吻合。若未吻合，稍微轉動吸口蓋然後再試一次，但不要太用力。
6. 如何觀測剩餘藥量：當計數視窗顯示“020”時，就應考慮換新的吸入器。當計數視窗顯示“000”時，就一定要換新，此後按壓所噴出藥量可能無法給予完整劑量。
7. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次

用藥時間，在下次用藥時間用藥即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

## 80 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是活動性/非活動性肺結核、甲狀腺疾病、心血管相關疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 ritonavir、ketoconazole、erythromycin。
3. 本藥無法快速緩解氣喘急性發作，故氣喘發作期不應使用本藥治療，需改用短效吸入型支氣管擴張劑。
4. 本藥即使無症狀依然建議繼續常規使用才能達到最好的治療效果，並且不該隨意調整劑量須遵照醫囑使用。
5. 使用完後請漱口**並且吐掉**，減少口腔與喉嚨念珠菌病發生的機率。
6. 常見副作用為可能有咳嗽、聲音嘶啞、心悸、頭痛等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。