



藥物成分	劑型	櫃號
Fluconazole	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-211		

## ☞ 藥品商品名及含量

泰復肯膠囊 50 毫克/膠囊 (Diflucan)

膚黴克膠囊 50 毫克/膠囊 (Fluene)

## ☞ 藥品作用

治療念珠菌局部或全身感染、囊球菌感染、預防後天免疫缺乏症候群病人的黴菌感染。

## ☞ 服用方式

1. 依不同的黴菌感染有不同的使用劑量與頻次，需按照醫師的指示來使用。服用時可空腹或與食物一起併用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對此藥或其他藥物過敏；是否有其他疾病，特別是肝臟、腎臟相關疾病。
2. 本藥會影響肝臟代謝的酵素，易有藥物交互作用，請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥 warfarin、sulfonylureas 類降血糖藥、免疫抑制藥 tacrolimus、抗黴菌藥 voriconazole、macrolides 類抗生素、抗憂鬱藥 citalopram、抗心律不整 quinidine 等。
3. 泰復肯膠囊含有乳糖，有半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕見遺傳疾病的病人應避免使用。
4. 泰復肯膠囊服用後可能會產生頭暈的副作用，若駕駛或操作機械時須注意。
5. 常見副作用為噁心、嘔吐及頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

- 
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心律失常；過敏反應(皮膚發疹、發癢)；肝功能異常(食慾降低、疲倦、胃腸不適、茶色尿、皮膚或眼白變黃)。
  7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應/臨床資料不足/有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。在整個治療期間至最後一劑服藥後至少 1 週應採取有效避孕措施，避免懷孕。
  8. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。