

藥物成分

劑型

櫃號

Propylthiouracil

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-720

## ☞ 藥品商品名及含量

僕樂彼錠 50 毫克/錠 (Polupi)

## ☞ 藥品作用

此藥抑制甲狀腺荷爾蒙之產生過剩，抑制心肌之氧氣消耗，增進心臟機能效率。用於治療甲狀腺機能亢進症。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2~4 次，每次 1~2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時可補吃上一次忘記吃的藥量(亦即服用 2 次的藥量)，之後回復正常的服藥時間與劑量。若曾忘記服藥，請告知醫師或藥師。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟疾病(肝炎、黃疸)或血液疾病(白血球減少、再生不良性貧血、血小板減少)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是碘及碘化物、抗凝血劑(例：warfarin)。
3. 如果有要開刀或拔牙，請告訴其他科別的醫師或牙醫師您正在服用此藥。
4. 常見副作用為皮膚紅疹、蕁麻疹等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：發燒、紅疹、咳嚨痛、頭痛、眼睛或皮膚變黃、皮膚癢、右側腹痛且食慾不振，異常出血或瘀青。
6. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。