



藥物成分

劑型

櫃號

Labetalol

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-641

☞ 藥品商品名及含量

壓血泰膜衣錠 200 毫克/錠 (Labtal)

☞ 藥品作用

降血壓，可放鬆血管減輕心臟的負荷。

☞ 服用方式

1. 通常一日 2 次，每次半粒至 2 粒。
2. 可與食物併服或空腹服用，請固定服用方法。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心臟或肝臟疾病、甲狀腺異常、氣喘或糖尿病等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他心臟病或高血壓藥物，氣喘、頭痛、過敏、感冒或止痛藥。
3. 服用此藥請小心，此藥會讓心跳變慢，糖尿病患者服用後可能使低血糖副作用發生時的心跳過速不明顯。
4. 如果您將需麻醉的手術(包含牙科手術)，要記得告訴醫師您正在使用該藥物。
5. 常見副作用為頭暈、頭皮刺痛、心跳變慢、姿勢性低血壓，偶爾可能會引起皮膚紅疹、腸胃不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸急促或哮喘、足踝下肢的水腫、體重突然增加、胸痛
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
8. 此藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。