



藥物成分	劑型	櫃號
Rifampicin/ Isoniazid	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-728		

☞ 藥品商品名及含量

樂肺寧糖衣錠 (Rifinah[®] [150])

含 Rifampicin 150mg 及 Isoniazid 100mg

利肺膠囊 (Rina Capsules)

含 Rifampicin 300mg 及 Isoniazid 150mg

祛核-二合膜衣錠 (Macox Plus 300)

含 Rifampicin 300mg 及 Isoniazid 150mg

☞ 藥品作用

Rifampicin 和 Isoniazid 均為有效的殺菌性抗結核劑。

Rifampicin 能抑制細菌細胞內的 DNA 依賴性 RNA 聚合酶，進而抑制細菌繁殖及生長。Isoniazid 抑制細菌細胞壁的合成。

☞ 服用方式

1. 利肺膠囊&祛核-二合膜衣錠：病人體重 50 公斤或以上時，每天一次，每次 2 粒。

2. 樂肺寧[150]糖衣錠：當病人體重少於 50 公斤時，每天 1 次，每次 3 粒。

3. 應於餐前至少 30 分鐘或餐後 2 小時服用，可以和其他的抗結核劑併服。

4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是慢性肝炎、黃疸。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，因

Rifampicin 可能誘導代謝酵素，因而影響其他藥物的藥效。

3. 請避免飲酒，以免增加肝炎風險。
4. 請避免同時服用乳酪、起司、紅酒等含有酪胺 (tyramine) 的食物，以免造成藥物濃度提高。
5. 禁止與 saquinavir/ritonavir 併用。
6. 本藥可能會使尿液、汗液、痰及淚液的顏色變紅。軟性隱形眼鏡可能被染色。此為正常現象。
7. 老年人、營養不良、易出現神經病變(例如糖尿病)及青少年患者使用本藥治療時，建議併用 pyridoxine(維生素 B6)。
8. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、周邊神經炎、類感冒症狀、肝炎、皮膚或皮下組織不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
9. 如果有下列症狀，請立刻就醫：異常肌肉疼痛或不尋常的疲倦、虛弱感或痙攣、皮膚出現黃疸現象、肝功能檢查異常、蕁麻疹或較嚴重的皮膚過敏反應 (例如：Steven-Johnson syndrome)。
10. 本藥未針對孕婦做過良好的對照性研究，因此醫師對孕婦或可能懷孕者會衡量利弊才可使用。
11. 本藥中的兩種成份 rifampicin 及 isoniazid 會進入母體乳汁。因此，哺乳的母親只有在藥品對嬰兒的潛在利益大於其風險時才能使用。