



| 藥物成分                     | 劑型  | 櫃號 |
|--------------------------|-----|----|
| Phenytoin                | 口服藥 |    |
| 版本：TPE202309／櫃號：2023-698 |     |    |

## ☞ 藥品商品名及含量

癲能停膠囊 100 毫克/膠囊 (Dilantin Kapseals)

苯乙內醯脲錠 100 毫克/錠 (Phenytoin)

## ☞ 藥品作用

Phenytoin 作用於腦部及神經系統用於治療癲癇。此藥也可能用於治療其他病症，請詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2~3 次，每次 1 粒。
2. 即使您已感覺好轉，仍應繼續服用此藥；未經醫師同意前，不可自行停用此藥，尤其是已經服用大劑量一段時間後；突然停藥可能導致抽搐，醫師可能會逐漸降低劑量。
3. **請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。** 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是禁止與 delavirdine 併用，其他如：酒精、抗生素 (erythromycin, sulfonamide, chloramphenicol, isoniazid(INH), rifampin)、抗黴菌藥 (ketoconazole, fluconazole)、血清素再吸收抑制劑 (fluoxetine, fluvoxamine, sertraline)、鎮靜安眠劑 (diazepam)、theophylline 等。
3. 使用本藥常見副作用大多發生於中樞神經系統，且通常與劑量有關，故須仔細監控以調整 phenytoin 之劑量。
4. 常見副作用為頭昏、疲倦、短暫緊張、運動痙攣、頭痛、感覺異常，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：昏迷、呼吸困難、流鼻血、容易瘀血、皮膚疹。
6. 妊娠投與本劑有很多畸型發展報告，故妊婦及可能懷孕之婦女應確認其有益性大於危險且經醫師同意後才能使用。本藥會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。