



藥物成分	劑型	櫃號
Ambroxol HCl	口服藥	
版本：TPE202310 / 檔號：2023-020		

☞ 藥品商品名及含量

平痰息錠 30 毫克/錠 (Mubroxol)

安嗽錠 30 毫克/錠 (Ambroxol)

樂咳痰舒長效錠 / 錠 75 毫克 (Loxol SR)

☞ 藥品作用

祛痰，本藥具有黏液排除促進作用與溶解分泌物的作用，可幫助呼吸順暢。

☞ 服用方式

1. 常用劑量每日 3 次，一次 1 粒，飯後服用
2. 長效劑型每日 1 次，一次 1 粒，服用時以充分的開水整粒吞服，不可咀嚼
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是重度腎衰竭、胃潰瘍、惡性纖毛症候群、嚴重皮膚損害、乳糖不耐症、苯酮尿症。
2. 臨床上並無與其他藥物有任何不良的交互作用報告。
3. 常見副作用為消化道副作用、呼吸道乾燥現象、皮疹、蕁麻疹等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)、過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)。
5. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

臺北市立

6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/

藥師。

TAIPEI CITY

TAINAN CITY HOSPITAL

HO

臺南市立醫院

TAIPEI CITY

TAINAN CITY HOSPITAL

HO

臺南市立醫院

TAIPEI CITY

TAINAN CITY HOSPITAL

HO

臺南市立醫院