



藥物成分	劑型	櫃號
Levofloxacin	口服藥	

版本：TPE202309／檔號：2023-272

☞ 藥品商品名及含量

平福樂欣膜衣錠 750 毫克/錠 (Levofloxacin F.C. TAB)

佐淨菌膜衣錠 500 毫克/錠 (Leflodal F.C. TAB)

可樂必妥膜衣錠 500 毫克/錠 (Cravit F.C. TAB)

☞ 藥品作用

治療成人因對 levofloxacin 有感受性的致病菌所引起之下列感染：急性鼻竇炎、慢性支氣管炎的急性惡化、社區型肺炎、複雜性尿道感染(包括：腎盂腎炎)，慢性細菌性前列腺炎，皮膚和軟組織感染。

☞ 服用方式

1. 通常每日服用一次，每次一粒。
2. 錠劑應被整顆吞服，並飲用足量的水，可在用餐時或兩餐之間服用。
3. 請遵醫囑指示服用，切勿自行更改服用劑量、頻次、使用天數或突然停藥，避免產生抗藥性。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 levofloxacin 或其他 quinolone 過敏、重症肌無力、懷孕、準備懷孕、哺乳、癲癇。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是：抗凝血劑(如 warfarin)、支氣管擴張劑 theophylline、抗心律不整藥物、類固醇等。
3. 若必須服用綜合維他命、含鋁、鎂、鐵等金屬離子藥品(如鐵劑、制酸劑 Sucralfate 等)或保健食品時，應至少相隔 2

個小時，避免影響藥效。

4. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 可能會增加曬太陽產生的過敏(如：紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
6. 糖尿病病人在服藥期間應頻繁監測血糖。
7. 常見副作用為頭痛、眩暈、發昏、混亂、疲累、肌肉痛、虛弱、失眠、味覺改變、食慾下降、糞便變軟等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. 老年人、腎功能不良、曾進行器官移植或同時併用皮質類固醇的病人發生肌腱炎或肌腱斷裂之風險可能增加。肌腱炎可能在服藥後 48 小時內發生，若發生此情形請停藥並盡速就醫。
9. 如服藥後發生嚴重、持續及/或出血性之腹瀉，不可服用止瀉劑及抑制腸蠕動藥物，請盡速就醫。
10. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致造成生長遲緩的紀錄，女性計畫懷孕、已懷孕或哺乳中請告知您的醫師。