



藥物成分	劑型	櫃號
Ezetimibe/ Simvastatin	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-204		

☞ 藥品商品名及含量

維妥力錠 10/20 毫克/錠 (Vytorin)

愛脂婷錠 10/20 毫克/錠 (Agitin)

☞ 藥品作用

原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症、植物脂醇血症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 可以在一天中的任何時候服用，隨餐或空腹均可。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加次數。若不慎忘記服藥請立即補服，但若已接近下次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是中、重度肝功能異常者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 statin 類、fibrate 類、降膽酸藥物及其他降血脂藥物。
3. 合併服用降膽酸藥物時，服用之後，必須間隔兩小時以上才能服用降膽酸藥物，或服用降膽酸藥物之後，必須間隔四小時以上才能服用。
4. 常見副作用為腸胃道不適(如腹瀉)、疲勞、背或關節痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：不預期的肌肉疼痛、觸痛、虛弱無力、尿液變深或糞便顏色變白、發燒、噁心、嘔吐、胃痛、過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)。
6. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。