



藥物成分	劑型	櫃號
Cyproheptadine	口服液	

版本：TPE202309／檔號：2023-562

## ☞ 藥品商品名及含量

希普利敏液 0.4 毫克/毫升 120 毫升/瓶 (Cypromin Sol'n)

喜普液 0.4 毫克/毫升 120 毫升/瓶 (Cyproh Sol'n)

## ☞ 藥品作用

是一種抗組織胺劑，可用來治療一些搔癢症(濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症、藥物過敏反應)、枯草熱、蕁麻疹、過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒支氣管炎引起之咳嗽、鼻涕。

## ☞ 服用方式

1. 成人：通常每日 3 次，每次 10 毫升。7-14 歲孩童：通常每日 2-3 次，每次 10 毫升。2-6 歲孩童：通常每日 2-3 次，每次 5 毫升。臨床上常依體重作衡量，請依醫師或藥袋指示給藥。
2. 若所需服用水劑大於 5 毫升，可使用小量杯給藥；若小於 5 毫升，使用針筒、滴管或口服餵藥器較為準確。
3. 若使用小量杯測量藥液，請確保測量時眼睛與刻度平視。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是狹角性青光眼、有症狀的前列腺肥大。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 MAOI 類抗憂鬱劑。
3. 酒精：請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的作用。
4. 常見副作用為嗜眠、口乾等，但一般都不嚴重，若症狀

惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮疹、蕁麻疹、水腫。

6. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。