



藥物成分

劑型

櫃號

Pirenoxine

眼用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-349

## ☞ 藥品商品名及含量

柯寧優尼點眼懸液 0.005% 5 毫升/瓶 (Kary Uni OPH Suspension)

## ☞ 藥品作用

老人性白內障。

## ☞ 使用方式

1. 每日 3-5 次，每次 1-2 滴。
2. 使用前請振搖均勻。
3. 同時使用兩種以上之眼藥，請先用藥水再用藥膏，並間隔 5 分鐘。
4. 容器尖端應避免接觸眼睛、眼瞼、手指頭等部位。
5. 開封 4 週後，未用完之殘藥請丟棄。
6. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 治療期間請暫停配戴隱形眼鏡。
4. 建議在點藥後閉合鼻淚管或輕輕閉上眼睛 2 分鐘。這可以減少點眼藥物經由眼部通道所造成的全身性吸收、因而降低全身性不良反應。
5. 本品若混入金屬離子會產生變色，請小心保存。
6. 常見副作用為結膜充血、刺激感、搔癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. **如果有下列症狀，請立刻就醫：瀰漫性表層角膜炎。**