



藥物成分

劑型

櫃號

Acarbose

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-504

## ☞ 藥品商品名及含量

糖利平錠 50 毫克/錠 (Carlipin)

抵克糖錠 50 毫克/錠 (Deglu)

## ☞ 藥品作用

本藥可抑制腸道內負責分解醣類的酵素，能延遲並減少飯後血糖升高，主要用來治療第二型(非胰島素依賴型)糖尿病。

## ☞ 服用方式

1. 初期：一天 3 次，每次 1 錠；後繼：一天 3 次，每次 2 錠，最高劑量可一天 3 次 200mg，**必須在用餐前以少量液體，整顆吞服或用餐時與前數口食物一起咬碎吞下。**
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用餐時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量

## ☞ 注意事項

1. 本藥對孩童及青少年藥效及耐受性資料不足，不可使用於年齡小於 18 歲者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他腸道疾病，特別是明顯消化吸收障礙、重度疝氣、大腸激躁症、腸阻塞、腸潰瘍或肝腎功能不全。
3. 不可使用於嚴重腎功能不全的患者( $CrCl < 25ml/min$ )。
4. 請告訴醫師您是否有在服用其他藥物，特別是 digoxin、aspirin。
5. 若有使用腸吸附劑、Cholestyramine 及消化酵素製劑，須與本藥需隔開最少 2 小時使用
6. 常見副作用為胃腸脹氣、腹瀉、腹痛、噁心(較少見)，但通常不嚴重，可藉由減少食用碳水化合物改善，且一般

過幾周症狀會慢慢消失，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 服藥後若發生下列症狀：皮膚過敏反應、水腫、腹部劇烈絞痛、皮膚/眼睛變黃，請立刻就醫或回診。
8. 單獨使用本藥極少出現低血糖，但若與其他有低血糖副作用的降血糖藥物併用時，須特別留意低血糖及監測血糖。
9. 使用本藥若發生低血糖時，不可服用非單醣類糖分作補充(例如蔗糖、糖果或家用糖)，須使用果糖或葡萄糖作補充。
10. 本藥和其他糖尿病治療劑如 sulphonylureas、metformin、或 insulin 合用而使血糖值降低到血糖過低範圍時，必須適當降低 sylphonylureas、metformin 或 insulin 的使用劑量。
11. 懷孕等級 B，若女性計畫懷孕請告知醫師/藥師；本藥無法排除對嬰兒的風險，哺乳期建議諮詢您的醫師或藥師。