



藥物成分	劑型	櫃號
Simethicone	口服液	
版本：TPE202309／櫃號：2023-745		

☞ 藥品商品名及含

胃樂佳懸浮液 20 毫克/毫升 (Degastom)

胃爾康懸浮液 20 毫克/毫升 (Wilcon)

☞ 藥品作用

解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

☞ 使用方式

1. 通常每日 3-4 次，每次服用 2 毫升。
2. 使用前須搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對本藥成分過敏。
2. 3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。
3. 常見副作用為軟便、胃部重壓感、拉肚子、噁心、食欲不振、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果連續服用本藥數日後，症狀沒有改善，請立刻就醫。
5. 此藥用於孕婦及哺乳婦女的安全性仍未確立，故除非醫師評估使用的益處大過於風險才可使用。
6. 未開封請於室溫(15-30°C)儲存，避免陽光直接照射；開封後，置於室溫(30°C 以下)可存放 4 週，如發生變質或過期，不可再使用。