

藥物成分

劑型

櫃號

Allopurinol

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-516

☞ 藥品商品名及含量

安樂普利諾錠 100 毫克/錠 (Allopurinol)

欣律錠 100 毫克/錠 (Synorid)

☞ 藥品作用

治療痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。

☞ 服用方式

1. 通常每日服用 1~3 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是糖尿病、高血壓、免疫疾病、癌症、肝臟或腎臟疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗生素(amoxicillin)、抗凝血劑、癌症藥物(azathioprine、cyclophosphamide)、高血壓藥(利尿劑)、theophylline。
3. 在一開始使用的半年內可能會增加痛風發作的頻率，但只是暫時的現象切勿任意停藥。
4. Allopurinol 可在飯後服用，以減輕胃腸道刺激。
5. 服藥期間請勿飲酒。
6. 常見副作用為過敏性皮膚炎(如:皮疹)、瘙癢(少見)等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：有可能發生罕見但嚴重的皮膚過敏反應，如出現喉嚨痛、嘴巴破、眼睛癢、皮膚紅疹等，應立即停藥，回診主治醫師。

臺北市立

8. 懷孕等級 C，對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師/藥師；對嬰兒的風險無法排除，有需要哺乳請事先諮詢。