



藥物成分

劑型

櫃號

Zonisamide

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-451

☞ 藥品商品名及含量

佐能安膜衣錠 100 毫克/錠 (Zonegran Film-coated Tablets 100mg/tab)

☞ 藥品作用

成人局部癲癇發作之輔助治療。

適用於下列癲癇發作類型：

1. 單純性局部癲癇發作。
2. 複雜性局部癲癇發作。
3. 局部癲癇發作續發型之全身性強直-陣攣性發作。

☞ 服用方式

1. 起始劑量為每日 100 mg，後續以一到二週為間隔逐漸提高劑量至每日 200 mg 至 400 mg，分 1 至 3 次服用。每日最高劑量為 500mg。
2. 藥物可空腹或隨餐服用。
3. 請遵照醫師處方服用，未經醫師同意切勿自行調整藥量或停藥，以免引起癲癇發作。

☞ 不良反應

嗜睡、頭暈、厭食、噁心、頭痛等

☞ 注意事項

1. 對 zonisamide 或磺胺類藥物(sulphonamides)過敏者，禁止使用此藥。
2. 本藥可能產生罕見的嚴重皮疹，如史蒂文生氏-強生症候群。如出現不明原因皮疹、水泡或脫皮，請盡速就醫。
3. 使用本藥品請勿飲酒。
4. 有些患者可能會感到昏昏欲睡或難以集中注意力，特別是在治療初期或增加劑量後。從事需要高度警覺性的活動時應謹慎，例如駕駛或操作機器。
5. 服用本藥後，少數人(特別是孩童)可能會有排汗減少與

體溫升高的現象，請多注意補充水分，並且避免暴露於高溫環境下。

6. 胎兒的風險未被證實有傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知您的醫師。zonisamide 會長期停留在體內，需完成治療後一個月才可開始哺乳。如有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。