



藥物成分	劑型	櫃號
Azelastine	鼻噴劑	
版本：TPE202309／檔號：2023-529		

## 藥品商品名及含量

噴立停鼻用噴液劑 1 毫克/毫升 120 次劑量

(Azetin®)

愛鼻安鼻用噴液劑 1 毫克/毫升 100 次劑量

(Azela®)



指導短片

## 藥品作用

是一種抗組織胺鼻用噴劑，用於過敏性鼻炎。

## 使用方式

1. 輕擤鼻子，將鼻孔清理乾淨。
2. 打開瓶蓋及扣環。
3. 將藥品搖勻。
4. 以拇指頂住瓶底，以食指和中指夾住瓶頸之環座。
5. 將噴頭插入一側鼻孔中，以另一隻手的手指輕壓另一側鼻孔，依上述方法快速壓下噴頭，同時緩緩深吸氣，將噴鼻液吸入鼻腔內，然後自口部慢慢呼氣。(如圖一)
6. 在另一邊鼻孔重複相同步驟。
7. 使用完畢，將噴頭以面紙輕拭乾淨，蓋回保護蓋。
8. 請依照醫師指示使用，不建議在未經指示情況下自行增加使用次數。若忘記使用，在6小時內仍可以補一次劑量，若已超過6小時則等至下次用藥時間使用即可，不可一次使用雙倍的劑量。

## 注意事項

1. 每瓶第一次使用前，對空噴壓藥劑數次，直到有藥劑噴出。接下來使用不需再排空空氣，如果到下次使用前的時間超過24小時，使用前只需對空噴壓一次即可。(如圖二)
2. 本藥品可儲存於室溫，避免直接日照或冷凍。
3. 對本藥品之成分有過敏者，禁止使用。
4. 應避免同時服用酒精類容液及其他中樞神經抑制劑，因為

可能會加強中樞神經抑制作用。

5. 少數例子報告，本藥品對發炎的鼻黏膜有刺激性，如刺痛、發癢、打噴嚏、流鼻血等狀況，一般情況下並不嚴重的話可觀察並繼續使用，若症狀惡化且無法忍受請回診告知您的醫師。
6. 在給藥後可能產生苦味(導因於不當的使用方法，如頭部過於向後傾斜)，且偶而可能導致噁心的感覺。
7. 其他如頭痛、想睡、眩暈、口乾、鼻腔乾燥等情形也曾出現於臨床試驗報告中。
8. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師
9. 本藥品不應使用於授乳期，因尚無足夠證據顯示授乳期使用是安全的，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。



圖一



圖二