



藥物成分

劑型

櫃號

Policresulen

陰道栓劑

版本：TPE202309／檔號：2023-353

☞ 藥品商品名及含量

保理寧陰道栓劑 90 毫克/粒 (Polinin V.T.)

安可治陰道栓劑 90 毫克/粒 (Albothyl V.T.)

☞ 藥品作用

治療子宮頸糜爛、子宮頸炎、陰道炎、白帶。

☞ 使用方式

1. 一般於睡前洗澡後使用，通常每次使用一粒，使用頻率請依照醫師指示。
2. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。
3. 使用方式
 - (1) 使用前後需用肥皂及清水將雙手洗淨。
 - (2) 撕開栓劑外包裝。
 - (3) 仰躺於床上，雙腿打開將塞劑尖端部份朝前，以食指將塞劑塞入陰道約 1-2 指節深。
 - (4) 藥品塞入後請暫勿起床走動，白天可使用護墊以免分泌物弄髒底褲。

☞ 注意事項

1. 使用前請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 平時應存放於陰涼處並防潮，若栓劑因炎熱變軟無法順利塞入時，可將其置於冰箱冷藏數分鐘後再使用。
4. 若開始使用前，已知正在月經期或月經期快開始，請主動諮詢醫師，評估是否需等經期結束後再開始療程。使用後若遇到月經期，原則上無需中斷療程，若欲暫停使用請務

必詢問醫師。

5. 治療期間請避免性交或用刺激性的盥洗用品灌洗陰道，可穿著寬鬆服飾，以棉質內褲為佳，保持外陰部透氣乾爽。
6. 常見副作用為輕微搔癢、灼熱感、分泌物產生，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀 請立刻就醫：持續的刺激感、疼痛、腹痛或過敏反應(皮膚紅疹)。
8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師 / 藥師。