



藥物成分

劑型

櫃號

Pilocarpine

眼用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-341

☞ 藥品商品名及含量

愛舒特開明眼藥水 2% 15 毫升/瓶 (Isopto Carpine)

☞ 藥品作用

縮瞳劑用於控制慢性青光眼之眼壓。

☞ 使用方式

1. 一般為每日 3 次，每次點 2 滴。
2. 蓋子打開後，如果防開啟束環鬆脫，請先將其移除再開始使用產品。
3. 為了防止藥水瓶尖端及藥水受到污染，請小心不要使藥水瓶尖端接觸到眼瞼、周邊或其他表面。未使用時，請保持瓶蓋蓋緊。
4. 使用兩種以上眼藥時，先使用藥水再用藥膏，並間隔至少 5 分鐘。
5. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是急性虹彩炎、狹角性青光眼、前葡萄膜炎、近視、視網膜剝離病史、角膜或結膜損傷、心臟衰竭、支氣管性氣喘、消化性潰瘍、甲狀腺功能亢進、胃腸道痙攣、巴金森氏症、泌尿道阻塞、心肌梗塞病史、高血壓、低血壓。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 建議在點藥後閉合鼻淚管或輕輕閉上眼睛 2 分鐘。這可以減少點眼藥物經由眼部通道所造成的全身性吸收、因而降低全身性不良反應。
4. 本藥會使瞳孔縮小，可能造成視線模糊與難以適應黑暗，

於夜間駕駛或光線不佳處進行危險工作時，應格外謹慎。

5. 用藥期間，請定期進行眼底檢查。
6. 常見副作用為頭痛、頭暈、視線模糊、眼部充血、噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：盜汗、心搏過緩、嘔吐、氣喘。
8. 使用前務必取下隱形眼鏡，並在用藥至少 15 分鐘後再重新配戴。
9. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中，口服同成分藥品有致畸胎的紀錄。眼部局部給藥的全身暴露量較口服藥品低，但仍無法排除對胎兒造成傷害的可能，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
10. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。