



藥物成分

劑型

櫃號

**Potassium
Chloride**

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-355

☞ 藥品商品名及含量

康是鉀持續性藥效錠 750 毫克/錠 (Const-K E.R.)

☞ 藥品作用

鉀離子補充，每一錠中含有相當於10毫當量的鉀離子。

☞ 服用方式

1. 本藥每日劑量需根據臨床反應做出個人化調整，請遵照醫師指示調整劑量。
2. 請勿壓碎、咀嚼或吸吮。
3. 本藥易引起胃刺激，請勿空腹服藥，建議在進餐時搭配一杯白開水或其他適量液體吞嚥。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對鉀製劑過敏、嚴重腎衰竭、高血鉀症、代謝性酸中毒、胃腸道阻塞的病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是留鉀性利尿劑(spironolactone、triamterene、amiloride)或其他含鉀之製劑。
3. 此蠟質錠劑不會被吸收，可能隨排泄物完整排出。若患者看到此現象，並非藥效未發揮。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、腸胃脹氣、腹部疼痛、腹瀉等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫



6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/
藥師。